

## Stanovisko k očkování proti covid-19 u osob s HIV/AIDS

1. Jednoznačně doporučujeme každému, kdo žije s HIV infekcí, aby podstoupil očkování proti covid-19, jakmile bude mít tuto možnost.
2. Schválené vakcíny proti covid-19 jsou podle současných znalostí pro osoby žijící s HIV/AIDS stejně bezpečné jako pro ostatní populaci – neobsahují živý virus, ale pouze informaci, která navodí tvorbu protilátek proti viru SARS-CoV-2.
3. Očkování je doporučováno všem imunokompromitovaným osobám (tedy osobám s oslabenou obranyschopností), včetně osob s onkologickým onemocněním a pacientům užívajícím imunosupresivní (imunitu oslabující) léčbu.
4. Očkování není v současnosti schváleno pro osoby mladší 16 let v případě vakcíny Pfizer/BioNTech resp. 18 let u vakcíny Moderna a nemají se očkovat těhotné či kojící ženy.
5. Vhodnost očkování by měla být individuálně zvážena u osob, které v minulosti prodělaly závažnou alergickou reakci (tzv. anafylaxi) po požití potravin, očkování nebo podání léků.
6. Některé státy zařazují osoby s HIV/AIDS mezi skupiny s přednostním přístupem k vakcíně. Obecně lze doporučit, aby za zvýšeně rizikové s přednostním přístupem k očkování byli považováni pacienti s HIV infekcí
  - a. s počtem CD4+ lymfocytů pod 50 bb/ $\mu$ l
  - b. pokud prodělali v nedávné době závažnou komplikaci spojenou s HIV infekcí
  - c. s počtem CD4+ lymfocytů mezi 50 a 200 bb/ $\mu$ l a jiným důvodem, který významně zvyšuje riziko závažného průběhu covid-19

Pracovní skupina lékařů HIV center

12.1.2021